

26.09.2022

Immunoprofülaktika ekspertkomisjoni elektroonse koosoleku päevakord ja ettepanekud

Päevakord:

- Vaksineerimise soovitude uuendamine seoses Comirnaty omikroni tüvedele BA.4 ja BA.5 kohandatud vaktsiini EL turule jõudmisega;
- 5-11-aastastele lastele mõeldud Comirnaty vaktsiini esmane tõhustusdoos.

Arutelu ja soovitused:

- **Ekspertkomisjon peab oluliseks, et inimesed, eriti 60+ elanikkond ja 5+ riskirühmad, läheksid COVID-19 haiguse vastu vaksineerima enne respiratoorsete haiguste (sh COVID-19) hooaega. Kõik Eestis kasutusel olevad COVID-19 vaktsiinid vähendavad oluliselt rasket haigestumist, mis võib vajada haiglaravi või lõppeda surmaga.**

Aja jooksul immuunkaitse viiruse vastu langeb ja tõuseb raske haigestumise risk, eriti vanema elanikkonna seas. Eesti andmetel on 85% COVID-19 haigusega haiglasse sattuvatest inimestest 60+ inimesed.

- **Esmaseks vaksineerimiskuuriks soovitab ekspertkomisjon Eestis kasutada algse koostisega Comirnaty vaktsiini, Nuvaxovidi või Jcovdenit (Janssen)¹.**

Omikronile kohandatud vaktsiinidel ei ole näidustust esmaseks vaksineerimiskuuriks. Senistel andmetel kujundavad kõik algse koostisega COVID-19 vastased vaktsiinid hea esmase immuunsuse (sh rakulise immuunsuse). Praegu on ebapiisavalt andmeid bivalentsete COVID-19 vaktsiinide tõhususe kohta esmasel immuniseerimisel.

- **Esmaseks ja teiseks tõhustusdoosiks soovitab ekspertkomisjon Eestis kasutada omikroni tüvedele kohandatud bivalentseid Comirnaty ja Spikevax vaktsiine².**
- **Ekspertkomisjon soovitab laiendada COVID-19 vastase esmase tõhustusdoosi manustamist 5-11-aastastele riskirühma³ kuuluvatele lastele. Esmane tõhustusdoos sellele vanusgrupile on soovitatav manustada 6 kuud pärast viimast doosi või tervenemist antud vanusrühmale mõeldud Comirnaty vaktsiiniga.**

¹ Eestis on kasutusel algse koostisega Comirnaty, mis on mõeldud 5-11-aastastele lastele ja algse koostisega Comirnaty, mis on mõeldud 12+ elanikkonnale. Samuti on kasutusel Nuvaxovid ja Jcovden (mõlemad 18+ elanikkonnale). Spikevax originaalvaktsiini Eestis ei ole.

² Ravimi omaduste kokkuvõtte kohaselt võib Comirnaty algse koostisega vaktsiini kasutada tõhustusdoosi tegemiseks:

https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-epar-product-information_et.pdf

Bivalentsed Comirnaty vaktsiinid (BA.1 lk 66 ja BA.4-5 lk 87): https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-epar-product-information_et.pdf;

Bivalentne Spikevax vaktsiin (BA.1 lk 22): https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/spikevax-previously-covid-19-vaccine-moderna-epar-product-information_et.pdf

³ Riskirühmad on esitatud dokumendi Lisas 2: https://terviseamet.ee/sites/default/files/Nakkushaigused/Juhendid/COVID-19/juhis_tervishoiuteenuse_osutajale_esmatasandil_covid-19_alates_01.07.2022.pdf