

01.12.2021

## **Immunoprofülaktika ekspertkomisjoni 30.11.2021 koosoleku päevakord ja ettepanekud**

Päevakord:

- Milliseid spetsiifilisi soovitusi on vaja anda 5-11-aastaste laste vaksineerimisel täiendavalt vaktsiiniomaduste kokkuvõttele? On meil täiendavaid soovitusi?
- Soovitud 5-11-aastaste laste vaksineerimiseks pärast COVID-19 läbipõdemist?
- Muud küsimused

### **Ettepanek nr 1:**

EL müügiloa saanud COVID-19 vaktsiinidega vaksineerimise kasu ja riski suhe on positiivne kõikides vanuserühmades, kellele need on näidustatud.

Risk COVID-19 haiguse raskeks kuluks on eelkõige vanemates vanuserühmades. Riigi prioriteediks peaks jätkuvalt olema täiskasvanud elanikkonna, eeskätt 60+ vanusegruppide, hõlmatuse tõstmine esmase vaksineerimiskuuriga ja tõhustusdoosiga, et pidurdada COVID-19 haiguse levikut ning tagada tervishoiuteenuste toimepidevus.

Immunoprofülaktika ekspertkomisjon soovib lastevanematel vaksineerida ka lapsi vanuses 5-11-eluaastat, et vähendada haigestumust, raske haiguskulu ja tüsistuste riski selles vanusegrupis ning pidurdada viiruse levikut lastekollektiivides ja lähikondsete seas.

### **Ettepanek nr 2:**

Immunoprofülaktika ekspertkomisjon soovib manustada lastele vanuses 5-11-eluaastat kaks doosi Pfizer/BioNTech Comirnaty vaktsiini kuuenädalase intervalliga. Sama intervalliga manustatakse Pfizer/BioNTech Comirnaty vaktsiini Eestis ka üle 12-aastastele.

### **Ettepanek nr 3:**

COVID-19 haiguse läbipõdenud 5-11-aastaste laste vaksineerimisel järgida samu põhimõtteid nagu 12+ vanusrühma puhul, st

- kui laps on COVID-19 haiguse läbi põdenud, siis vaksineerida soovitavalt 6 kuul ühe Pfizer/BioNTech Comirnaty vaktsiini doosiga;
- kui laps haigestub kahe nädala jooksul pärast esimese Pfizer/BioNTech Comirnaty vaktsiinidoosi saamist, siis vaksineerida ühe doosiga soovitavalt 6. kuul pärast tervenemist;
- kui last on vaksineeritud ühe Pfizer/BioNTech Comirnaty doosiga ja ta haigestub COVID-19 haigusesse rohkem kui kaks nädalat pärast esimest doosi, kuid enne teise doosi saamist, siis ei ole vajalik teist doosi manustada.

**Ettepanek nr 4:**

Kui Pfizer/BioNTech Comirnaty vaktsineerimiskuuri esimese doosi saanud laps saab enne teist doosi 12-aastaseks, siis soovib immunoprofülaktika ekspertkomisjon lõpetada kuur sama vaktsiiniga ehk 5-11-aastastele lastele näidustatud vaktsiiniga.