

Tervise- ja tööministri .....juuni 2015. a määruse nr  
... "Sotsiaalministri 24. septembri 2002. a määruse  
nr 112 "Eesti Haigekassa ravimite loetelu"  
muutmise" lisa Sotsiaalministri 24. septembri  
2002. a määruse nr 112 "Eesti Haigekassa  
ravimite loetelu" lisa

## EESTI HAIGEKASSA RAVIMITE LOETELU

Lisatakse read järgmises sõnastuses:

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                           | Müügiloo hoidja        | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|------------------------|------------------|----------|--------|--------|-----------|------------|----------|
| 1660643         | duloksetiin, 30mg                | N06AX21  | DULSEVIA, gastroresistentne<br>kõvakapsel, 30TK | Krka, d.d., Novo Mesto | 50               |          |        |        |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus      | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                        | Müügiloa hoidja        | Soodus-<br>tus % | Diagnoos   | Eriala   | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|---------------------------------------|----------|--|------------------------|------------------|--|--|--------|-----------|------------|---|
| 1660733         | duloksetiin, 60mg                     | N06AX21  | DULSEVIA, gastroresistentne kõvakapsel, 30TK | Krka, d.d., Novo Mesto | 75               | G63.2-G63.2  | Neuroloog,<br>Endokrinoloog                              | esmane |           |            | ravimi esmase väljakirjutamise õigus neuroloogil, endokrinoloogil ja valuravi arstil juhul, kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti |
|                 |                                       |          |  |                        | 50               |  |  |        |           |            |   |
| 1588844         | epinefriin (adrenaliin), 150mcg 0.3ml | C01CA24  | EPIPEN, süstelahus pensüstlis, 2ml 1TK       | SIA Meda Pharma        | 100              | T88.6-T88.6, T78.0-T78.0, T88.2-T88.2, T80.5-T80.6, T78.2-T78.3, L50.0-L50.0 | Pediaater,<br>Allergoloog-<br>immunoloog,<br>Pulmonoloog | esmane |           |            |   |
|                 |                                       |          |  |                        | 50               |  |  |        |           |            |   |
| 1588866         | epinefriin (adrenaliin), 300mcg 0.3ml | C01CA24  | EPIPEN, süstelahus pensüstlis, 2ml 1TK       | SIA Meda Pharma        | 50               | T88.6-T88.6, T78.0-T78.0, T88.2-T88.2, T80.5-T80.6, T78.2-T78.3, L50.0-L50.0 | Allergoloog-<br>immunoloog,<br>Pediaater,<br>Pulmonoloog | esmane |           |            |   |
|                 |                                       |          |  |                        | 100              |  |  |        |           |            |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus             | Müügiloa hoidja              | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala  | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------------------|------------------------------|------------------|----------|---|--------|-----------|------------|--|
| 1514034         | fentanüül, 200mcg                | N02AB03  | BREAKYL, bukaalravimküle,<br>10TK | Meda Pharma GmbH<br>& Co. KG | 50<br>100        | C00-D48  | Neuroloog,<br>Hematoloog,<br>Onkoloog,<br>Reumatoloog,<br>Anestesioloog | esmane |           |            | ravimi esmase<br>väljakirjutamise õigus<br>onkoloogil,<br>hematoloogil ja<br>valuravi<br>lisapädevusega<br>anestesioloogil,<br>reumatoloogil ja<br>neurooloogil<br>pahaloomulisest<br>kasvajast tingitud<br>läbimurdevalu raviks<br>juhul, kui adekvaatses<br>annuses<br>opioidsäilitusravi foonil<br>(vähemalt 60mg<br>suukaudset morfiini<br>ööpäevas, 25 mcg/h<br>transdermaalset<br>fentanüüli, 30mg<br>oksükodooni ööpäevas<br>vm opioidi<br>ekvianalgeetilist<br>annust on kasutatud<br>vähemalt ühe nädala<br>vältel) ilmnevad<br>läbimurdevalu<br>episoodid (vähemalt 2<br>episoodi ööpäevas)<br>ning lühitoimeline<br>suukaudne morfiin on<br>ravimvormi, ebapiisava<br>tõhususe või<br>kõrvaltoimete tõttu<br>sobimatu |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                      | Müügiloa hoidja                    | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala  | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|------------------------------------|------------------|---|---|--------|-----------|------------|--|
| 1586796         | fentanüül, 400mcg                | N02AB03  | BREAKYL, bukaalravimküle, 10TK             | Meda Pharma GmbH & Co. KG          | 100              | C00-D48   | Reumatoloog,<br>Onkoloog,<br>Hematoloog,<br>Neuroloog,<br>Anestesioloog | esmane |           |            | ravimi esmase väljakirjutamise õigus onkoloogil, hematoloogil ja valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil ja neuroloogil pahaloomulisest kasvajast tingitud läbimurdevalu raviks juhul, kui adekvaatses annuses opioidsäilitusravi foonil (vähemalt 60mg suukaudset morfiini ööpäevas, 25 mcg/h transdermaalset fentanüüli, 30mg oksükodooni ööpäevas vm opioidi ekvivalgeetilist annust on kasutatud vähemalt ühe nädala vältel) ilmnevad läbimurdevalu episoodid (vähemalt 2 episoodi ööpäevas) ning lühitoimeline suukaudne morfiin on ravimvormi, ebapiisava tõhususe või kõrvaltoimete tõttu sobimatu |
|                 |                                  |          |  |                                    | 50               |   |   |        |           |            |  |
| 1665053         | glargiin-insuliin, 100ühik 1ml   | A10AE04  | ABASAGLAR, süstelahus pen-süstlis, 3ml 5TK | Eli Lilly Regional Operations GmbH | 100              | O24-O24, E13-E14, E10-E11, P70.2-P70.2, E89.1-E89.1 |   |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |                                    | 50               |   |   |        |           |            |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus  | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloo hoidja                    | Soodus-<br>tus % | Diagnoos   | Eriala                      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|-----------------------------------|----------|--|------------------------------------|------------------|--|-----------------------------|--------|-----------|------------|--|
| 1684043         | glargiin-insuliin,<br>300ühik 1ml | A10AE04  | TOUJEO SOLOSTAR,<br>süstelahus pen-süstlis, 1.5ml<br>5TK             | Sanofi-Aventis<br>Deutschland GmbH | 100              | O24-O24, E13-E14,<br>E10-E11, P70.2-<br>P70.2, E89.1-E89.1 |                             |        |           |            |  |
|                 |                                   |          |  |                                    | 50               |  |                             |        |           |            |  |
| 1618196         | glatirameeratsetaat,<br>40mg 1ml  | L03AX13  | COPAXONE, süstelahus<br>süstlis, 1ml 12TK                            | Teva Pharmaceuticals<br>Limited    | 100              | G35-G35  | Neuroloog                   | esmane |           |            | konsiiliumi (kolme<br>neuroloogi ühise)<br>otsuse alusel<br>ägenemiste ja<br>remissioonidega<br>kulgeva hulgiskleroosi<br>raviks patsientidele,<br>kellele<br>beetainterferoon on<br>meditsiiniliselt<br>vastunäidustatud või<br>osutunud<br>ebaefektiivseks või<br>talumatuks |
| 1675931         | kaltsitriool, 0,25mcg             | A11CC04  | ROCALTROL, pehmekapsel,<br>30TK                                      | First Pharma OÜ                    | 100              | E89.2-E89.2, E20-<br>E20                                   | Endokrinoloog,<br>Pediaater |        |           |            |  |
|                 |                                   |          |  |                                    | 100              | N25-N25, N18-N18   | Pediaater, Nefroloog        |        |           |            |  |
|                 |                                   |          |  |                                    | 50               |  |                             |        |           |            |  |
| 1636792         | kvetiapiin, 150mg                 | N05AH04  | KVENTIAX SR, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 60TK | Krka d.d. Novo Mesto               | 100              | F20-F29, F30-F31   | Psühhiaater                 |        |           |            | kui risperidoon on<br>ebaefektiivne,<br>vastunäidustatud või<br>põhjustab olulisi<br>kõrvaltoimeid   |
|                 |                                   |          |  |                                    | 50               |  |                             |        |           |            |  |
| 1636859         | kvetiapiin, 200mg                 | N05AH04  | KVENTIAX SR, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 60TK | Krka d.d. Novo Mesto               | 50               |  |                             |        |           |            |  |
|                 |                                   |          |  |                                    | 100              | F20-F29, F30-F31   | Psühhiaater                 |        |           |            | kui risperidoon on<br>ebaefektiivne,<br>vastunäidustatud või<br>põhjustab olulisi<br>kõrvaltoimeid   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus                             | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja      | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala                                      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|--|----------|---|----------------------|------------------|------------------|---|--------|-----------|------------|--|
| 1636916         | kvetiapiin, 300mg  | N05AH04  | KVENTIAX SR, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 60TK                  | Krka d.d. Novo Mesto | 100              | F20-F29, F30-F31 | Psühhiaater                                 |        |           |            | kui risperidoon on<br>ebaefektiivne,<br>vastunäidustatud või<br>põhjustab olulisi<br>kõrvaltoimeid   |
|                 |  |          |   |                      | 50               |                  |   |        |           |            |  |
| 1629716         | levodopa+karbidopa+e<br>ntakapoon,<br>100mg+25mg+200mg       | N04BA03  | LEVODOPA/CARBIDOPA/EN<br>TACAPONE TEVA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>100TK | Teva Pharma B.V.     | 100              | G20-G20          | Neuroloog                                   | esmane |           |            |  |
|                 |  |          |   |                      | 50               |                  |   |        |           |            |  |
| 1630257         | levodopa+karbidopa+e<br>ntakapoon,<br>150mg+37,5mg+200m<br>g | N04BA03  | LEVODOPA/CARBIDOPA/EN<br>TACAPONE TEVA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>100TK | Teva Pharma B.V.     | 50               |                  |   |        |           |            |  |
|                 |  |          |   |                      | 100              | G20-G20          | Neuroloog                                   | esmane |           |            |  |
| 1630527         | levodopa+karbidopa+e<br>ntakapoon,<br>200mg+50mg+200mg       | N04BA03  | LEVODOPA/CARBIDOPA/EN<br>TACAPONE TEVA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>100TK | Teva Pharma B.V.     | 50               |                  |   |        |           |            |  |
|                 |  |          |   |                      | 100              | G20-G20          | Neuroloog                                   | esmane |           |            |  |
| 1629974         | levodopa+karbidopa+e<br>ntakapoon,<br>75mg+18,75mg+200m<br>g | N04BA03  | LEVODOPA/CARBIDOPA/EN<br>TACAPONE TEVA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>100TK | Teva Pharma B.V.     | 100              | G20-G20          | Neuroloog                                   | esmane |           |            |  |
|                 |  |          |   |                      | 50               |                  |   |        |           |            |  |
| 1684155         | metadoon, 20mg   | N07BC02  | METADON DAK, tablett,<br>100TK  | Takeda Pharma AS     | 50               |                  |   |        |           |            |  |
|                 |  |          |   |                      | 100              | R52.1-R52.1      | Reumatoloog,<br>Anestesioloog,<br>Neuroloog | esmane |           |            | esmase<br>väljakirjutamise õigus<br>valuravi<br>lisapädevusega<br>anestesioloogil ja<br>reumatoloogil ja<br>neuroloogil ühe aasta<br>jooksul |
|                 |  |          |   |                      | 100              | C00-D48          |   |        |           |            |  |
| 1265329         | metformiin, 1000mg   | A10BA02  | METFORMIN - TEVA,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 120TK                       | Teva Pharma B.V.     | 50               |                  |   |        |           |            |  |
|                 |  |          |   |                      | 75               | E14-E14, E11-E11 |   |        |           |            |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus          | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|---|----------|--|-----------------|------------------|------------------|--------|--------|-----------|------------|---|
| 1637917         | metformiin+dapagliflosi<br>in, 1000mg+5mg | A10BD15  | XIGDUO, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>56TK | AstraZeneca AB  | 75               | E14-E14, E11-E11 |        |        |           |            | kombinatsioonraviks<br>rasvumusega<br>patsientidel<br>(KMI>=30kg/m2);<br>kombinatsioonravi<br>peab sisaldama<br>sulfonüüluurea<br>preparaati, välja<br>arvatud juhul kui see<br>on meditsiiniliselt<br>vastunäidustatud |
|                 |   |          |  |                 | 50               |                  |        |        |           |            |   |
| 1637861         | metformiin+dapagliflosi<br>in, 850mg+5mg  | A10BD15  | XIGDUO, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>56TK | AstraZeneca AB  | 75               | E14-E14, E11-E11 |        |        |           |            | kombinatsioonraviks<br>rasvumusega<br>patsientidel<br>(KMI>=30kg/m2);<br>kombinatsioonravi<br>peab sisaldama<br>sulfonüüluurea<br>preparaati, välja<br>arvatud juhul kui see<br>on meditsiiniliselt<br>vastunäidustatud |
|                 |   |          |  |                 | 50               |                  |        |        |           |            |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloo hoidja                          | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|--|------------------|-------------|-------------|--------|-----------|------------|---|
| 1396335         | metüülfenidaat, 10mg             | N06BA04  | MEDIKINET XL 10MG,<br>toimeainet prolongeeritult<br>vabastav kõvakapsel, 30TK | MEDICE Arzneimittel<br>Pütter GmbH & Co. | 75               | F90.0-F90.1 | Psühhiaater | esmane | 20,00     |            | vastavalt Eesti<br>Haigekassa ravimite<br>loetelus kehtestatud<br>tingimustele lapse- või<br>noorukieas alustatud<br>ravi jätkamiseks 20-<br>aastastel ja vanematel<br>patsientidel ühe aasta<br>jooksul. |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|-------------|-------------|--------|-----------|------------|---|
|                 |                                  |          |                       |                 | 75               | F90.0-F90.1 | Psühhiaater |        | 6,00      | 20,00      | ravimi väljakirjutamise õigus laste ravi lisapädevusega psühhiaatril järgmistel tingimustel: ravi alustamise otsuse on langetanud lastepsühhiaatriline meeskond (kaks Eesti Psühhiaatrite Seltsi poolt tunnustatud laste ravi lisapädevusega psühhiaatrit, kliiniline psühholoog ja logopeed-eripedagoog); diagnoos on kinnitatud vähemasti kahes erinevas keskkonnas (perekond, haridusasutus) lapsega kokkupuutuva isiku küsitluse alusel; patsiendil esineb mõõdukas või raske toimetulekuraskus (kliinilise pildi kirjelduse alusel, C-GAS skoor <=50 punkti); ravi toimub koos samaaegse psühhosotsiaalsete meetmete rakendamisega |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloo hoidja                          | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|--|------------------|-------------|-------------|--------|-----------|------------|---|
| 1396368         | metüülfenidaat, 20mg             | N06BA04  | MEDIKINET XL 20MG,<br>toimeainet prolongeeritult<br>vabastav kõvakapsel, 30TK | MEDICE Arzneimittel<br>Pütter GmbH & Co. | 75               | F90.0-F90.1 | Psühhiaater | esmane | 20,00     |            | vastavalt Eesti<br>Haigekassa ravimite<br>loetelus kehtestatud<br>tingimustele lapse- või<br>noorukieas alustatud<br>ravi jätkamiseks 20-<br>aastastel ja vanematel<br>patsientidel ühe aasta<br>jooksul. |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|-------------|-------------|--------|-----------|------------|---|
|                 |                                  |          |                       |                 | 75               | F90.0-F90.1 | Psühhiaater |        | 6,00      | 20,00      | ravimi väljakirjutamise õigus laste ravi lisapädevusega psühhiaatril järgmistel tingimustel: ravi alustamise otsuse on langetanud lastepsühhiaatriline meeskond (kaks Eesti Psühhiaatrite Seltsi poolt tunnustatud laste ravi lisapädevusega psühhiaatrit, kliiniline psühholoog ja logopeed-eripedagoog); diagnoos on kinnitatud vähemasti kahes erinevas keskkonnas (perekond, haridusasutus) lapsega kokkupuutuva isiku küsitluse alusel; patsiendil esineb mõõdukas või raske toimetulekuraskus (kliinilise pildi kirjelduse alusel, C-GAS skoor <=50 punkti); ravi toimub koos samaaegse psühhosotsiaalsete meetmete rakendamisega |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloo hoidja                          | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|--|------------------|-------------|-------------|--------|-----------|------------|---|
| 1396391         | metüülfenidaat, 30mg             | N06BA04  | MEDIKINET XL 30MG,<br>toimeainet prolongeeritult<br>vabastav kõvakapsel, 30TK | MEDICE Arzneimittel<br>Pütter GmbH & Co. | 75               | F90.0-F90.1 | Psühhiaater | esmane | 20,00     |            | vastavalt Eesti<br>Haigekassa ravimite<br>loetelus kehtestatud<br>tingimustele lapse- või<br>noorukieas alustatud<br>ravi jätkamiseks 20-<br>aastastel ja vanematel<br>patsientidel ühe aasta<br>jooksul. |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|-------------|-------------|--------|-----------|------------|---|
|                 |                                  |          |                       |                 | 75               | F90.0-F90.1 | Psühhiaater |        | 6,00      | 20,00      | ravimi väljakirjutamise õigus laste ravi lisapädevusega psühhiaatril järgmistel tingimustel: ravi alustamise otsuse on langetanud lastepsühhiaatriline meeskond (kaks Eesti Psühhiaatrite Seltsi poolt tunnustatud laste ravi lisapädevusega psühhiaatrit, kliiniline psühholoog ja logopeed-eripedagoog); diagnoos on kinnitatud vähemasti kahes erinevas keskkonnas (perekond, haridusasutus) lapsega kokkupuutuva isiku küsitluse alusel; patsiendil esineb mõõdukas või raske toimetulekuraskus (kliinilise pildi kirjelduse alusel, C-GAS skoor <=50 punkti); ravi toimub koos samaaegse psühhosotsiaalsete meetmete rakendamisega |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja                          | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|--|------------------|-------------|-------------|--------|-----------|------------|---|
| 1395266         | metüülfenidaat, 40mg             | N06BA04  | MEDIKINET XL 40MG,<br>toimeainet prolongeeritult<br>vabastav kõvakapsel, 30TK | MEDICE Arzneimittel<br>Pütter GmbH & Co. | 75               | F90.0-F90.1 | Psühhiaater | esmane | 20,00     |            | vastavalt Eesti<br>Haigekassa ravimite<br>loetelus kehtestatud<br>tingimustele lapse- või<br>noorukieas alustatud<br>ravi jätkamiseks 20-<br>aastastel ja vanematel<br>patsientidel ühe aasta<br>jooksul. |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|-------------|-------------|--------|-----------|------------|---|
|                 |                                  |          |                       |                 | 75               | F90.0-F90.1 | Psühhiaater |        | 6,00      | 20,00      | ravimi väljakirjutamise õigus laste ravi lisapädevusega psühhiaatril järgmistel tingimustel: ravi alustamise otsuse on langetanud lastepsühhiaatriline meeskond (kaks Eesti Psühhiaatrite Seltsi poolt tunnustatud laste ravi lisapädevusega psühhiaatrit, kliiniline psühholoog ja logopeed-eripedagoog); diagnoos on kinnitatud vähemasti kahes erinevas keskkonnas (perekond, haridusasutus) lapsega kokkupuutuva isiku küsitluse alusel; patsiendil esineb mõõdukas või raske toimetulekuraskus (kliinilise pildi kirjelduse alusel, C-GAS skoor <=50 punkti); ravi toimub koos samaaegse psühhosotsiaalsete meetmete rakendamisega |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja                          | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|--|------------------|-------------|-------------|--------|-----------|------------|--|
| 1395334         | metüülfenidaat, 5mg              | N06BA04  | MEDIKINET XL 5MG,<br>toimeainet prolongeeritult<br>vabastav kõvakapsel, 30TK | MEDICE Arzneimittel<br>Pütter GmbH & Co. | 75               | F90.0-F90.1 | Psühhiaater |        | 6,00      | 20,00      | ravimi väljakirjutamise<br>õigus laste ravi<br>lisapädevusega<br>psühhiaatril järgmistel<br>tingimustel: ravi<br>alustamise otsuse on<br>langetanud<br>lastepsühhiaatriline<br>meeskond (kaks Eesti<br>Psühhiaatrite Seltsi<br>poolt tunnustatud laste<br>ravi lisapädevusega<br>psühhiaatrit, kliiniline<br>psühholoog ja<br>logopeed-<br>eripedagoog);<br>diagnoos on kinnitatud<br>vähemasti kahes<br>erinevas keskkonnas<br>(perekond,<br>haridusasutus)<br>lapsega kokkupuutuva<br>isiku küsitluse alusel;<br>patsiendil esineb<br>mõõdukas või raske<br>toimetulekuraskus<br>(kliinilise pildi<br>kirjelduse alusel, C-<br>GAS skoor <=50<br>punkti); ravi toimub<br>koos samaaegse<br>psühhosotsiaalsete<br>meetmete<br>rakendamisega |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                      | Müügiloo hoidja       | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala                      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla   | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|-----------------------|------------------|-------------|-----------------------------|--------|-----------|--|---|
|                 |                                  |          |  |                       | 75               | F90.0-F90.1 | Psühhiaater                 | esmane | 20,00     |  | vastavalt Eesti Haigekassa ravimite loetelus kehtestatud tingimustele lapse- või noorukieas alustatud ravi jätkamiseks 20-aastastel ja vanematel patsientidel ühe aasta jooksul.  |
| 1677719         | pramipeksool, 3,15mg             | N04BC05  | OPRYMEA, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK | KRKA d.d., Novo Mesto | 50               |             |                             |        |           |  |   |
|                 |                                  |          |  |                       | 100              | G20-G20     | Neuroloog                   | esmane |           |  |   |
| 1655513         | pregabaliin, 150mg               | N03AX16  | PRAGIOLA, kõvakapsel, 14TK                                 | KRKA d.d., Novo mesto | 75               | G63.2-G63.2 | Endokrinoloog,<br>Neuroloog | esmane |           |  | ravimi esmase väljakirjutamise õigus neuroloogil, endokrinoloogil ja valuravi arstil juhul, kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti |
|                 |                                  |          |  |                       | 50               |             |                             |        |           |  |   |
|                 |                                  |          |  |                       | 100              | G40-G40     | Neuroloog                   | esmane |           | kui vana põlvkonna ravimid on vastunäidustatud, ebaefektiivsed või põhjustavad olulisi kõrvaltoimeid |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus         | Müügiloa hoidja          | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala                      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|-------------------------------|--------------------------|------------------|-------------|-----------------------------|--------|-----------|------------|--|
| 1655546         | pregabaliin, 150mg               | N03AX16  | PRAGIOLA, kõvakapsel,<br>56TK | KRKA d.d., Novo<br>mesto | 100              | G40-G40     | Neuroloog                   | esmane |           |            | kui vana põlvkonna<br>ravimid on<br>vastunäidustatud,<br>ebaefektiivsed või<br>põhjustavad olulisi<br>kõrvaltoimeid  |
|                 |                                  |          |                               |                          | 50               |             |                             |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |                               |                          | 75               | G63.2-G63.2 | Neuroloog,<br>Endokrinoloog | esmane |           |            | ravimi esmase<br>väljakirjutamise õigus<br>neuroloogil,<br>endokrinoloogil ja<br>valuravi arstil juhul, kui<br>eelistatud ravi<br>tritsüklilise<br>antidepressandiga on<br>vastunäidustatud,<br>põhjustab ravi<br>katkestama sundivaid<br>kõrvaltoimeid või ei ole<br>vähemasti 3-kuulise<br>kasutamise järel<br>andnud piisavat<br>raviefekti |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus         | Müügiloa hoidja          | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala                      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|-------------------------------|--------------------------|------------------|-------------|-----------------------------|--------|-----------|------------|---|
| 1655760         | pregabaliin, 300mg               | N03AX16  | PRAGIOLA, kõvakapsel,<br>14TK | KRKA d.d., Novo<br>mesto | 100              | G40-G40     | Neuroloog                   | esmane |           |            | kui vana põlvkonna<br>ravimid on<br>vastunäidustatud,<br>ebaefektiivsed või<br>põhjustavad olulisi<br>kõrvaltoimeid   |
|                 |                                  |          |                               |                          | 75               | G63.2-G63.2 | Endokrinoloog,<br>Neuroloog | esmane |           |            | ravimi esmase<br>väljakirjutamise õigus<br>neurooloogil,<br>endokrinoloogil ja<br>valuravi arstil juhul, kui<br>eelistatud ravi<br>tritsüklilise<br>antidepressandiga on<br>vastunäidustatud,<br>põhjustab ravi<br>katkestama sundivaid<br>kõrvaltoimeid või ei ole<br>vähemasti 3-kuulise<br>kasutamise järel<br>andnud piisavat<br>raviefekti |
|                 |                                  |          |                               |                          | 50               |             |                             |        |           |            |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus         | Müügiloa hoidja          | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala                      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|-------------------------------|--------------------------|------------------|-------------|-----------------------------|--------|-----------|------------|--|
| 1655355         | pregabaliin, 75mg                | N03AX16  | PRAGIOLA, kõvakapsel,<br>14TK | KRKA d.d., Novo<br>mesto | 75               | G63.2-G63.2 | Endokrinoloog,<br>Neuroloog | esmane |           |            | ravimi esmase<br>väljakirjutamise õigus<br>neuroloogil,<br>endokrinoloogil ja<br>valuravi arstil juhul, kui<br>eelistatud ravi<br>tritsüklilise<br>antidepressandiga on<br>vastunäidustatud,<br>põhjustab ravi<br>katkestama sundivaid<br>kõrvaltoimeid või ei ole<br>vähemasti 3-kuulise<br>kasutamise järel<br>andnud piisavat<br>raviefekti |
|                 |                                  |          |                               |                          | 50               |             |                             |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |                               |                          | 100              | G40-G40     | Neuroloog                   | esmane |           |            | kui vana põlvkonna<br>ravimid on<br>vastunäidustatud,<br>ebaefektiivsed või<br>põhjustavad olulisi<br>kõrvaltoimeid  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus    | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja          | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala                      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla  | Märkused   |
|-----------------|-------------------------------------|----------|---|--------------------------|------------------|-------------|-----------------------------|--------|-----------|---|--|
| 1655388         | pregabaliin, 75mg                   | N03AX16  | PRAGIOLA, kõvakapsel,<br>56TK                                       | KRKA d.d., Novo<br>mesto | 75               | G63.2-G63.2 | Endokrinoloog,<br>Neuroloog | esmane |           |   | ravimi esmase<br>väljakirjutamise õigus<br>neuroloogil,<br>endokrinoloogil ja<br>valuravi arstil juhul, kui<br>eelistatud ravi<br>tritsüklilise<br>antidepressandiga on<br>vastunäidustatud,<br>põhjustab ravi<br>katkestama sundivaid<br>kõrvaltoimeid või ei ole<br>vähemasti 3-kuulise<br>kasutamise järel<br>andnud piisavat<br>raviefekti |
|                 |                                     |          |   |                          | 100              | G40-G40     | Neuroloog                   | esmane |           | kui vana põlvkonna<br>ravimid on<br>vastunäidustatud,<br>ebaefektiivsed või<br>põhjustavad olulisi<br>kõrvaltoimeid |  |
|                 |                                     |          |   |                          | 50               |             |                             |        |           |   |  |
| 1278053         | sumatriptaan, 100mg                 | N02CC01  | SUMATRIPTAN ACTAVIS,<br>tablett, 6TK                                | Actavis Group PTC ehf    | 50               |             |                             |        |           |   |  |
| 1678125         | sumatriptaan, 100mg                 | N02CC01  | CINIE 100 MG, tablett, 6TK  | First Pharma OÜ          | 50               |             |                             |        |           |   |  |
| 1277995         | sumatriptaan, 50mg                  | N02CC01  | SUMATRIPTAN ACTAVIS,<br>tablett, 6TK                                | Actavis Group PTC ehf    | 50               |             |                             |        |           |   |  |
| 1176353         | terbinafiin, 250mg                  | D01BA02  | TERBINAFIN ACTAVIS,<br>tablett, 56TK                                | Actavis Nordic A/S       | 50               |             |                             |        |           |   |  |
| 7015777         | toitained ilma<br>fenüülalaniinita, |          | PKU Lophlex LQ Juicy<br>tropical 10, suukaudne lahus,<br>62,5ml N60 | SHS International Ltd    | 100              | E70.0-E70.1 |                             |        |           |   |  |
| 7015755         | toitained ilma<br>fenüülalaniinita, |          | PKU Lophlex LQ Juicy<br>berries 10, suukaudne lahus,<br>62,5ml N60  | SHS International Ltd    | 100              | E70.0-E70.1 |                             |        |           |   |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus    | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloo hoidja       | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|----------|--|-----------------------|------------------|-------------|--------|--------|-----------|------------|----------|
| 7015766         | toitained ilma<br>fenüülalaniinita, |          | PKU Lophlex LQ Juicy<br>tropical 20, suukaudne lahus,<br>125ml N30 | SHS International Ltd | 100              | E70.0-E70.1 |        |        |           |            |          |
| 7015744         | toitained ilma<br>fenüülalaniinita, |          | PKU Lophlex LQ Juicy<br>berries 20, suukaudne lahus,<br>125ml N30  | SHS International Ltd | 100              | E70.0-E70.1 |        |        |           |            |          |
| 1380721         | östradiool, 10mcg                   | G03CA03  | VAGIFEM, vaginaaltablett,<br>18TK                                  | Novo Nordisk A/S      | 50               |             |        |        |           |            |          |

Muudetakse read ja sõnastatakse järgmiselt:

| Ravimi-kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus       | Müügiloa hoidja            | Soodus-tus % | Diagnoos    | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-------------|-------------------------------|----------|-----------------------------|----------------------------|--------------|-------------|-------------|--------|-----------|------------|---|
| 1299652     | atomoksetiin, 100mg           | N06BA09  | STRATTERA, kõvakapsel, 28TK | Eli Lilly Holdings Limited | 75           | F90.0-F90.1 | Psühhiaater | esmane | 20,00     |            | vastavalt Eesti Haigekassa ravimite loetelus kehtestatud tingimustele lapse- või noorukieas alustatud ravi jätkamiseks 20-aastastel ja vanematel patsientidel ühe aasta jooksul |
| 1190708     | atomoksetiin, 10mg            | N06BA09  | STRATTERA, kõvakapsel, 28TK | Eli Lilly Holdings Limited | 75           | F90.0-F90.1 | Psühhiaater | esmane | 20,00     |            | vastavalt Eesti Haigekassa ravimite loetelus kehtestatud tingimustele lapse- või noorukieas alustatud ravi jätkamiseks 20-aastastel ja vanematel patsientidel ühe aasta jooksul |
| 1190742     | atomoksetiin, 18mg            | N06BA09  | STRATTERA, kõvakapsel, 28TK | Eli Lilly Holdings Limited | 75           | F90.0-F90.1 | Psühhiaater | esmane | 20,00     |            | vastavalt Eesti Haigekassa ravimite loetelus kehtestatud tingimustele lapse- või noorukieas alustatud ravi jätkamiseks 20-aastastel ja vanematel patsientidel ühe aasta jooksul |
| 1190786     | atomoksetiin, 25mg            | N06BA09  | STRATTERA, kõvakapsel, 28TK | Eli Lilly Holdings Limited | 75           | F90.0-F90.1 | Psühhiaater | esmane | 20,00     |            | vastavalt Eesti Haigekassa ravimite loetelus kehtestatud tingimustele lapse- või noorukieas alustatud ravi jätkamiseks 20-aastastel ja vanematel patsientidel ühe aasta jooksul |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus          | Müügiloo hoidja               | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|--------------------------------|-------------------------------|------------------|-------------|-------------|--------|-----------|------------|--|
| 1190821         | atomoksetiin, 40mg               | N06BA09  | STRATTERA, kõvakapsel,<br>28TK | Eli Lilly Holdings<br>Limited | 75               | F90.0-F90.1 | Psühhiaater | esmane | 20,00     |            | vastavalt Eesti<br>Haigekassa ravimite<br>loetelus kehtestatud<br>tingimustele lapse- või<br>noorukieas alustatud<br>ravi jätkamiseks 20-<br>aastastel ja vanematel<br>patsientidel ühe aasta<br>jooksul |
| 1190865         | atomoksetiin, 60mg               | N06BA09  | STRATTERA, kõvakapsel,<br>28TK | Eli Lilly Holdings<br>Limited | 75               | F90.0-F90.1 | Psühhiaater | esmane | 20,00     |            | vastavalt Eesti<br>Haigekassa ravimite<br>loetelus kehtestatud<br>tingimustele lapse- või<br>noorukieas alustatud<br>ravi jätkamiseks 20-<br>aastastel ja vanematel<br>patsientidel ühe aasta<br>jooksul |
| 1299618         | atomoksetiin, 80mg               | N06BA09  | STRATTERA, kõvakapsel,<br>28TK | Eli Lilly Holdings<br>Limited | 75               | F90.0-F90.1 | Psühhiaater | esmane | 20,00     |            | vastavalt Eesti<br>Haigekassa ravimite<br>loetelus kehtestatud<br>tingimustele lapse- või<br>noorukieas alustatud<br>ravi jätkamiseks 20-<br>aastastel ja vanematel<br>patsientidel ühe aasta<br>jooksul |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                       | Müügiloo hoidja            | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|----------------------------|------------------|-------------|-------------|--------|-----------|------------|--|
| 1462003         | eltrombopaag, 25mg               | B02BX05  | REVLADE, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK             | Novartis Europharm Limited | 100              | D69.4-D69.4 |             |        |           |            | patsientidele, kelle ravi alustamine on hinnatud konsiiliumi (vähemalt 3 hematoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele - muu suukaudne ravi (kortikosteroidi, immuunsupressandiga ) on osutunud ebaefektiivseks või on vastunäidustatud, splenektomia on osutunud ebaefektiivseks või on vastunäidustatud (sh splenektomia ettevalmistamiseks, kui intravenoosne immuunglobuliin ei ole piisavalt tõhus) ning esineb trombotsütopeenia <20 000/µl |
| 1313569         | metüülfenidaat, 18mg             | N06BA04  | CONCERTA, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK | Johnson & Johnson UAB      | 75               | F90.0-F90.1 | Psühhiaater | esmane | 20,00     |            | vastavalt Eesti Haigekassa ravimite loetelus kehtestatud tingimustele lapse- või noorukieas alustatud ravi jätkamiseks 20-aastastel ja vanematel patsientidel ühe aasta jooksul.   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloo hoidja          | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|--------------------------|------------------|-------------|-------------|--------|-----------|------------|---|
| 1313581         | metüülfenidaat, 36mg             | N06BA04  | CONCERTA, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 30TK | Johnson & Johnson<br>UAB | 75               | F90.0-F90.1 | Psühhiaater | esmane | 20,00     |            | vastavalt Eesti<br>Haigekassa ravimite<br>loetelus kehtestatud<br>tingimustele lapse- või<br>noorukieas alustatud<br>ravi jätkamiseks 20-<br>aastastel ja vanematel<br>patsientidel ühe aasta<br>jooksul. |
| 1313660         | metüülfenidaat, 54mg             | N06BA04  | CONCERTA, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 30TK | Johnson & Johnson<br>UAB | 75               | F90.0-F90.1 | Psühhiaater | esmane | 20,00     |            | vastavalt Eesti<br>Haigekassa ravimite<br>loetelus kehtestatud<br>tingimustele lapse- või<br>noorukieas alustatud<br>ravi jätkamiseks 20-<br>aastastel ja vanematel<br>patsientidel ühe aasta<br>jooksul. |

Tunnistatakse kehtetuks järgmised read:

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                            | Müügiloa hoidja            | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                  | Eriala   | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|----------------------------|------------------|---------------------------|--|--------|-----------|------------|---|
| 1147711         | amlodipiin, 5mg                  | C08CA01  | LOFRAL, tablett, 30TK                            | MEPHA Lda.                 | 75               | I15-I15, I10-I13, I20-I20 |  |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |  |                            | 50               |                           |  |        |           |            |   |
| 1207909         | bosentaan, 62,5mg                | C02KX01  | TRACLEER, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK | Actelion Registration Ltd. | 100              | I27.0-I27.0               | Kardioloog,<br>Pulmonoloog,<br>Pediaater,<br>Reumatoloog |        |           |            | NYHA III-IV kl idiopaatilise, süsteemse sidekoehaiguse või kaasasündinud südamerikkega seotud pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni raviks patsientidele konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel, kui sildenafil on vastunäidustatud, ostunud ebaefektiivseks või põhjustanud olulisi kõrvaltoimeid |
|                 |                                  |          |  |                            | 50               |                           |  |        |           |            |   |

| Ravimi-kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                        | Müügiloa hoidja                                 | Soodus-tus % | Diagnoos   | Eriala        | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-------------|-------------------------------|----------|--|---|--------------|--|---------------|--------|-----------|------------|---|
| 1258668     | deferasiroks, 500mg           | V03AC03  | EXJADE, dispergeeruv tablett, 28TK           | Novartis Europharm Limited                      | 100          | D57-D57, D47.1-D47.1, D56-D56, D60-D61, C81-C96, D46-D46 | Hematoloog    |        |           |            | konsiiliumi (vähemasti 3 hematoloogi) otsuse alusel järgmistele kriteeriumidele vastavate patsientide raviks: seerumi ferritiinitase on >1000 mcg/l; esineb jätkuv regulaarne vereülekannete vajadus (vähemasti 1 aasta jooksul on manustatud vähemasti 2 erütrotsüütide doosi kuu kohta ning sarnane vereülekannete vajadus püsib) või plaanitakse vereloome tüvirakkude siirdamist; müelodüsplastilise sündroomi või müelofibroosiga (D46, D47.1) patsientide riskiskoor on madal või madal-mõõdukas (IPSS 0-1) |
| 1090932     | deksametasoon, 1mg 1g         | S01BA01  | MAXIDEX, silmasalv, 3.5g 1TK                 | s.a. Alcon-Couvreur N.V.                        | 50           |  |               |        |           |            |   |
| 1160840     | didanosiin, 400mg             | J05AF02  | VIDEX EC, gastroresistentne kõvakapsel, 30TK | Bristol-Myers Squibb Gyogyszerkereskedelmi Kft. | 50           |  | Infektsionist |        |           |            | HIV-nakkuse profülaktikaks, v a tööülesannete täitmisega seotud kokkupuutejuhtudel HIV-nakkusega  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloo hoidja             | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala                         | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|-----------------------------|------------------|---|--------------------------------|--------|-----------|------------|--|
| 1001372         | diklofenak, 50mg                 | M01AB05  | DICLOFENAC-RATIOPHARM<br>50MG, gastroresistentne<br>tablett, 20TK         | ratiopharm GmbH             | 75               | M15-M19   |                                |        | 63,00     |            |  |
|                 |                                  |          |   |                             | 75               | M30-M33, M05-<br>M08, M35-M35,<br>M45-M46                 |                                |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |   |                             | 100              | C00-D48   |                                |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |   |                             | 50               |   |                                |        |           |            |  |
| 1028135         | felodipiin, 2,5mg                | C08CA02  | PLENDIL, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 30TK          | AstraZeneca AB              | 50               |   |                                |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |   |                             | 75               | I10-I13, I15-I15  |                                |        |           |            |  |
| 1161740         | gliklasiid, 30mg                 | A10BB09  | DIAPREL MR, toimeainet<br>modifitseeritult vabastav<br>tablett, 60TK      | Les Laboratories<br>Servier | 50               |   |                                |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |   |                             | 75               | E14-E14, E11-E11  |                                |        |           |            |  |
| 7000096         | imikute toitesegu,               |          | Aptamil Soya (Nutrilon Soya)<br>, pulber, 400 g                           | N.V. Nutricia               | 75               | K52.2-K52.2, L20.8-<br>L20.8, K90.4-K90.4,<br>L27.2-L27.2 |                                |        |           | 1,00       |  |
| 1037427         | isosorbiitmononitraat,<br>50mg   | C01DA14  | ELANTAN LONG, toimeainet<br>modifitseeritult vabastav<br>kõvakapsel, 20TK | UCB Pharma GmbH             | 50               |   |                                |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |   |                             | 75               | I20-I20   |                                |        |           |            |  |
| 1166688         | klaritromütsiin, 250mg           | J01FA09  | KLABAX, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>14TK                      | Ranbaxy (UK) Limited        | 50               |   |                                |        |           |            |  |
| 1166677         | klaritromütsiin, 500mg           | J01FA09  | KLABAX, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>14TK                      | Ranbaxy (UK) Limited        | 50               |   |                                |        |           |            |  |
| 1265453         | kvetiapiin, 200mg                | N05AH04  | HEDONIN 200 MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK              | G.L. Pharma GmbH            | 100              | F20-F29, F30-F31  | Psühhiaater                    |        |           |            | kui risperidoon on<br>ebaefektiivne,<br>vastunäidustatud või<br>põhjustab olulisi<br>kõrvaltoimeid |
|                 |                                  |          |   |                             | 50               |   |                                |        |           |            |  |
| 1086612         | loratadiin, 10mg                 | R06AX13  | CLARITINE, tablett, 30TK  | UAB Bayer                   | 50               |   |                                |        |           |            |  |
| 1044829         | mesalasiin, 500mg                | A07EC02  | SALOFALK, rektaalsuposiit,<br>10TK  | Dr. Falk Pharma<br>GmbH     | 75               | K51-K51, K50-K50  | Gastroenteroloog,<br>Pediaater |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |   |                             | 50               |   |                                |        |           |            |  |
| 1044841         | mesalasiin, 500mg                | A07EC02  | SALOFALK, gastroresistentne<br>tablett, 50TK                              | Dr. Falk Pharma<br>GmbH     | 50               |   |                                |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |   |                             | 75               | K51-K51, K50-K50  | Gastroenteroloog,<br>Pediaater |        |           |            |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus         | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                   | Müügiloo hoidja           | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|--|----------|---|---------------------------|------------------|------------------|--------|--------|-----------|------------|---|
| 1627185         | metformiin+alogliptiin,<br>1000mg+12,5mg | A10BD13  | VIPDOMET, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>56TK  | Takeda Pharma A/S         | 50               |                  |        |        |           |            |   |
|                 |  |          |   |                           | 75               | E14-E14, E11-E11 |        |        |           |            | II tüüpi diabeedi<br>kombinatsioonraviks;<br>kombinatsioonravi<br>peab sisaldama<br>sulfonüüluurea<br>preparaati, välja<br>arvatud juhul kui see<br>on meditsiiniliselt<br>vastunäidustatud   |
| 1084531         | montelukast, 10mg                        | R03DC03  | SINGULAIR, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK | Merck Sharp & Dohme<br>OÜ | 75               | J45-J45          |        |        |           | 11,00      |   |
|                 |  |          |   |                           | 75               | J45-J45          |        |        | 11,00     |            | mõõduka ja raske<br>bronhiaalastma korral<br>lisaks püsiravile<br>inhaleeritava<br>kortikosteroidi ja<br>pikatoimelise beeta-2-<br>adrenomimeetikumiga,<br>kui see ei taga<br>piisavat kontrolli astma<br>üle, või lisaks<br>püsiravile inhaleeritava<br>kortikosteroidiga, kui<br>beeta-2-<br>adrenomimeetikum on<br>vastunäidustatud või<br>põhjustab talumatuid<br>kõrvaltoimeid |
|                 |  |          |   |                           | 50               |                  |        |        |           |            |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                   | Müügiloo hoidja           | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla  | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|---------------------------|------------------|----------|--------|--------|-----------|---|----------|
| 1077364         | montelukast, 4mg                 | R03DC03  | SINGULAIR 4 MG,<br>närimistablett, 28TK | Merck Sharp & Dohme<br>OÜ | 75               | J45-J45  |        |        |           | 11,00   |          |
|                 |                                  |          |   |                           | 75               | J45-J45  |        |        | 11,00     | mõõduka ja raske<br>bronhiaalastma korral<br>lisaks püsiravile<br>inhaleeritava<br>kortikosteroidi ja<br>pikatoimelise beeta-2-<br>adrenomimeetikumiga,<br>kui see ei taga<br>piisavat kontrolli astma<br>üle, või lisaks<br>püsiravile inhaleeritava<br>kortikosteroidiga, kui<br>beeta-2-<br>adrenomimeetikum on<br>vastunäidustatud või<br>põhjustab talumatuid<br>kõrvaltoimeid |          |
|                 |                                  |          |   |                           | 50               |          |        |        |           |   |          |
| 1111082         | montelukast, 4mg                 | R03DC03  | SINGULAIR MINI 4MG,<br>graanulid, 28TK  | Merck Sharp & Dohme<br>OÜ | 75               | J45-J45  |        |        |           | 11,00   |          |
|                 |                                  |          |   |                           | 75               | J45-J45  |        |        | 11,00     | mõõduka ja raske<br>bronhiaalastma korral<br>lisaks püsiravile<br>inhaleeritava<br>kortikosteroidi ja<br>pikatoimelise beeta-2-<br>adrenomimeetikumiga,<br>kui see ei taga<br>piisavat kontrolli astma<br>üle, või lisaks<br>püsiravile inhaleeritava<br>kortikosteroidiga, kui<br>beeta-2-<br>adrenomimeetikum on<br>vastunäidustatud või<br>põhjustab talumatuid<br>kõrvaltoimeid |          |
|                 |                                  |          |   |                           | 50               |          |        |        |           |   |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                     | Müügiloo hoidja        | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla  | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|------------------------|------------------|----------|--------|--------|-----------|---|--|
| 1077331         | montelukast, 5mg                 | R03DC03  | SINGULAIR, närimistablett, 28TK                           | Merck Sharp & Dohme OÜ | 75               | J45-J45  |        |        |           | 11,00   |  |
|                 |                                  |          |   |                        | 50               |          |        |        |           |   |  |
|                 |                                  |          |   |                        | 75               | J45-J45  |        | 11,00  |           | mõõduka ja raske bronhiaalastma korral lisaks püsiravile inhaleeritava kortikosteroidi ja pikatoimelise beeta-2-adrenomimeetikumiga, kui see ei taga piisavat kontrolli astma üle, või lisaks püsiravile inhaleeritava kortikosteroidiga, kui beeta-2-adrenomimeetikum on vastunäidustatud või põhjustab talumatuid kõrvaltoimeid |  |
| 1041613         | omeprasool, 20mg                 | A02BC01  | OMEPRAZOLE-RATIOPHARM, gastroresistentne kõvakapsel, 15TK | ratiopharm GmbH        | 75               | K25-K27  |        |        |           |   | Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega |
|                 |                                  |          |   |                        | 50               |          |        |        |           |   |  |
| 1418802         | pantoprasool, 20mg               | A02BC02  | OZZION, gastroresistentne tablett, 14TK                   | Zentiva k.s.           | 75               | K25-K27  |        |        |           |   | Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega |
|                 |                                  |          |   |                        | 50               |          |        |        |           |   |  |
| 1418824         | pantoprasool, 40mg               | A02BC02  | OZZION, gastroresistentne tablett, 14TK                   | Zentiva k.s.           | 50               |          |        |        |           |   |  |
|                 |                                  |          |   |                        | 75               | K25-K27  |        |        |           | Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega  |  |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus        | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                    | Müügiloo hoidja                | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                      | Eriala    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|---|----------|--|--------------------------------|------------------|-------------------------------|-----------|--------|-----------|------------|---|
| 1554432         | perindopriil+indapamiid<br>, 4mg+1,25mg | C09BA04  | CO-PERINDALON, tablett,<br>30TK          | Sandoz<br>Pharmaceuticals d.d. | 50               |                               |           |        |           |            |   |
|                 |   |          |  |                                | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13 |           |        |           |            |   |
| 1498361         | pioglitason, 15mg                       | A10BG03  | ZIPION 15MG, tablett, 28TK               | Zentiva k.s.                   | 75               | E14-E14, E11-E11              |           |        |           |            | II tüüpi diabeedi<br>kombinatsioonraviks;<br>kombinatsioonravi<br>peab sisaldama<br>metformiini ja<br>sulfonüüluurea<br>preparaati või<br>vähemasti ühte neist,<br>juhul kui metformiin või<br>sulfonüüluurea<br>preparaat on<br>meditsiiniliselt<br>vastunäidustatud.              |
|                 |   |          |  |                                | 50               |                               |           |        |           |            |   |
| 1013588         | pioglitason, 45mg                       | A10BG03  | ACTOS, tablett, 28TK                     | Takeda Pharma A/S              | 75               | E14-E14, E11-E11              |           |        |           |            | II tüüpi diabeedi (E11,<br>E14)<br>kombinatsioonraviks;<br>kombinatsioonravi<br>peab sisaldama<br>metformiini ja<br>sulfonüüluurea<br>preparaati või<br>vähemasti ühte neist,<br>juhul kui metformiin või<br>sulfonüüluurea<br>preparaat on<br>meditsiiniliselt<br>vastunäidustatud |
|                 |   |          |  |                                | 50               |                               |           |        |           |            |   |
| 1373666         | pramipeksool, 0,18mg                    | N04BC05  | OPRYMEA, tablett, 30TK                   | KRKA d.d., Novo<br>Mesto       | 50               |                               |           |        |           |            |   |
|                 |   |          |  |                                | 100              | G20-G20                       | Neuroloog | esmane |           |            |   |
| 1123849         | proksümetakaiin, 5mg<br>1ml             | S01HA04  | ALCAINE, silmatilgad, lahus,<br>15ml 1TK | s.a. Alcon-Couvreur<br>N.V.    | 50               |                               |           |        |           |            |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                | Müügiloa hoidja                 | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla   | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|---------------------------------|------------------|---|--------|--------|-----------|--|---|
| 1359121         | ramipriil, 10mg                  | C09AA05  | RAMIGAMMA, tablett, 30TK                             | WÖRWAG PHARMA<br>GmbH & Co. KG  | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13   |        |        |           |  |   |
|                 |                                  |          |  |                                 | 50               |   |        |        |           |  |   |
| 1358940         | ramipriil, 2,5mg                 | C09AA05  | RAMIGAMMA, tablett, 30TK                             | WÖRWAG PHARMA<br>GmbH & Co. KG  | 50               |   |        |        |           |  |   |
|                 |                                  |          |  |                                 | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13   |        |        |           |  |   |
| 1359031         | ramipriil, 5mg                   | C09AA05  | RAMIGAMMA, tablett, 30TK                             | WÖRWAG PHARMA<br>GmbH & Co. KG  | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13   |        |        |           |  |   |
|                 |                                  |          |  |                                 | 50               |   |        |        |           |  |   |
| 1500949         | risedroonhape, 35mg              | M05BA07  | MELENOR, õhukese<br>polümeerikattega tablett, 4TK    | Medochemie Ltd                  | 75               | M80-M80   |        |        |           |  | patsientidele, kelle<br>lülisamba või<br>reieluukaela<br>mineraalne tihedus on<br>-2,5 SD või vähem<br>DEXA meetodil<br>määratuna |
|                 |                                  |          |  |                                 | 50               |   |        |        |           |  |   |
| 1010765         | simvastatiin, 10mg               | C10AA01  | SIMGAL, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK | TEVA Czech<br>Industries s.r.o. | 75               | E78-E78   |        |        |           |  | kui dieetravi järgselt ei<br>ole kolesterooli<br>sisaldus veres<br>vähenenud alla 8,0<br>mmol/l                                   |
|                 |                                  |          |  |                                 | 100              | N18-N18   |        |        |           | alates III staadiumist   |   |
|                 |                                  |          |  |                                 | 50               |   |        |        |           |  |   |
|                 |                                  |          |  |                                 | 75               | Z95-Z95, I21-I22,<br>I25-I25, Z45-Z45,<br>I63-I63, I70.2-I70.2,<br>E10-E11, E13-E14,<br>I65-I66 |        |        |           |  |   |
|                 |                                  |          |  |                                 | 75               | I11-I12   |        |        |           | raske südame- või<br>neerukahjustusega<br>hüpertensiooni<br>esinemisel |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloo hoidja                 | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla  | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|---------------------------------|------------------|---|--------|--------|-----------|---|--|
| 1147429         | simvastatiin, 10mg               | C10AA01  | SIMVAGAMMA 10MG,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 30TK | WÖRWAG PHARMA<br>GmbH & Co. KG  | 75               | I11-I12   |        |        |           |   | raske südame- või<br>neerukahjustusega<br>hüpertensiooni<br>esinemisel |
|                 |                                  |          |   |                                 | 75               | E78-E78   |        |        |           | kui dieetravi järgselt ei<br>ole kolesterooli<br>sisaldus veres<br>vähenenud alla 8,0<br>mmol/l |  |
|                 |                                  |          |   |                                 | 50               |   |        |        |           |   |  |
|                 |                                  |          |   |                                 | 75               | Z95-Z95, I21-I22,<br>I25-I25, Z45-Z45,<br>I63-I63, I70.2-I70.2,<br>E10-E11, E13-E14,<br>I65-I66 |        |        |           |   |  |
|                 |                                  |          |   |                                 | 100              | N18-N18   |        |        |           | alates III staadiumist  |  |
| 1010776         | simvastatiin, 20mg               | C10AA01  | SIMGAL, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK          | TEVA Czech<br>Industries s.r.o. | 75               | Z95-Z95, I21-I22,<br>I25-I25, Z45-Z45,<br>I63-I63, I70.2-I70.2,<br>E10-E11, E13-E14,<br>I65-I66 |        |        |           |   |  |
|                 |                                  |          |   |                                 | 75               | I11-I12   |        |        |           | raske südame- või<br>neerukahjustusega<br>hüpertensiooni<br>esinemisel                          |  |
|                 |                                  |          |   |                                 | 50               |   |        |        |           |   |  |
|                 |                                  |          |   |                                 | 100              | N18-N18   |        |        |           | alates III staadiumist  |  |
|                 |                                  |          |   |                                 | 75               | E78-E78   |        |        |           | kui dieetravi järgselt ei<br>ole kolesterooli<br>sisaldus veres<br>vähenenud alla 8,0<br>mmol/l |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja                | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla  | Märkused   |                        |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|--------------------------------|------------------|---|--------|--------|-----------|---|--|------------------------|
| 1147463         | simvastatiin, 20mg               | C10AA01  | SIMVAGAMMA 20MG,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 30TK       | WÖRWAG PHARMA<br>GmbH & Co. KG | 75               | Z95-Z95, I21-I22,<br>I25-I25, Z45-Z45,<br>I63-I63, I70.2-I70.2,<br>E10-E11, E13-E14,<br>I65-I66 |        |        |           |   |  |                        |
|                 |                                  |          |   |                                | 75               | I11-I12   |        |        |           |   | raske südame- või<br>neerukahjustusega<br>hüpertensiooni<br>esinemisel |                        |
|                 |                                  |          |   |                                | 50               |   |        |        |           |   |  |                        |
|                 |                                  |          |   |                                | 100              | N18-N18   |        |        |           | alates III staadiumist  |  |                        |
|                 |                                  |          |   |                                | 75               | E78-E78   |        |        |           | kui dieetravi järgselt ei<br>ole kolesterooli<br>sisaldus veres<br>vähenenud alla 8,0<br>mmol/l |  |                        |
| 1147508         | simvastatiin, 40mg               | C10AA01  | SIMVAGAMMA 40MG,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 30TK       | WÖRWAG PHARMA<br>GmbH & Co. KG | 100              | N18-N18   |        |        |           |   |  | alates III staadiumist |
|                 |                                  |          |   |                                | 75               | E78-E78   |        |        |           | kui dieetravi järgselt ei<br>ole kolesterooli<br>sisaldus veres<br>vähenenud alla 8,0<br>mmol/l |  |                        |
|                 |                                  |          |   |                                | 75               | I11-I12   |        |        |           | raske südame- või<br>neerukahjustusega<br>hüpertensiooni<br>esinemisel                          |  |                        |
|                 |                                  |          |   |                                | 75               | Z95-Z95, I21-I22,<br>I25-I25, Z45-Z45,<br>I63-I63, I70.2-I70.2,<br>E10-E11, E13-E14,<br>I65-I66 |        |        |           |   |  |                        |
|                 |                                  |          |   |                                | 50               |   |        |        |           |   |  |                        |
| 1188604         | tamsulosiin, 0,4mg               | G04CA02  | UROSTAD, toimeainet<br>modifitseeritud vabastav<br>kõvakapsel, 30TK | Stada Arzneimittel AG          | 50               |   |        |        |           |   |  |                        |
| 1060524         | telmisartaan, 40mg               | C09CA07  | PRITOR, tablett, 28TK   | Bayer Pharma AG                | 75               | I10-I13, I15-I15  |        |        |           |   |  |                        |
|                 |                                  |          |   |                                | 50               |   |        |        |           |   |  |                        |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloo hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|-----------------|------------------|------------------|--------|--------|-----------|------------|----------|
| 1183519         | telmisartaan, 80mg               | C09CA07  | PRITOR, tablett, 28TK   | Bayer Pharma AG | 75               | I10-I13, I15-I15 |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                 | 50               |                  |        |        |           |            |          |
| 1439322         | trimetasidiin, 35mg              | C01EB15  | ZIDMETIN, toimeainet<br>modifitseeritud vabastav<br>tablett, 60TK | Sandoz d.d.     | 50               |                  |        |        |           |            |          |