

Täiskasvanute revaktsineerimine leetrite vastu vs antikehade määramise test

Immunoprofülaktika ekspertkomisjoni soovitus: Soovitada täiskasvanutele eelkõige MMR revaktsineerimist, mitte antikehade määramise testi.

Põhjendus:

- Leetrite vastane immuunkaitse on seotud ka rakulise immuunsusega ning seetõttu ei välista madalam antikehade tase immuunkaitse olemasolu, kuid IgG testiga ei ole seda võimalik kindlaks teha;
- IgG testi tulemuste interpreteerimine on keerukas, sest erinevates laborites on kasutusel erinevad IgG testid ning seetõttu tuleb tulemuste tõlgendamisel lähtuda selle labori referentsväärtustest, kus test teostati;
- Tõendatud on kahe MMR vaktsiiniannuse tõhusus leetrite vastase kaitse tagamisel (<https://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/fullarticle/569784>);
- Revaktsineerimise soovitusel patsiendile tuleb lähtuda dokumenteeritud andmetest manustatud annuste või leetrite põdemise kohta ning individuaalsetest riskiteguritest (*kontakt leetrihaigega, tööalane võimalik kokkupuude leetrihaigega, reisimine, peres on alla 1-aastased lapsed, rasedad, immuunpuudulikkusega inimesed, kellele ei tohi manustada MMR vaktsiini jne*), võttes arvesse Terviseameti üldisi soovitusi MMR vaktsineerimise kohta (<https://www.vaktsineeri.ee/haigused-ja-vaktsiinid/haigused/leetrid>);
- Täiskasvanute revaktsineerimine MMR vaktsiiniga on tasuline.