

20.12.2021

Immunoprofülakтика ekspertkomisjoni 20.12.2021 koosoleku päevakord ja ettepanekud

Päevakord:

- kas lühendada esmase vaktsiini kuuri lõpetamise ja tõhustusdoosi vahelist aega?
- millal ja kellele tõhustusdoosi soovitada pärast läbipõdemist?

COVID-19 Omikroni variant on tänaseks levinud laialt kogu maailmas. Olemasolevad andmed näitavad selgelt, et tegemist on variandiga, mis levib palju kiiremini võrreldes Delta variandiga. Seetõttu on suur risk haiglakoormuse kiireks kasvuks ja suremuse suurenemiseks ka Eestis. Euroopa Raviamet ja Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa keskus (ECDC) on hinnanud tõhustusdoosid ohutuks ja efektiivseks juba kolme kuu möödumisel esmasest vaktsineerimiskuurist. Jansseni vaktsiini puhul on esmased andmed näidanud Jansseni vaktsiini ühe doosi vähest efektiivsust Omikroni variandi vastu. Tõhustusdoosina annavad parema kaitse Pfizer/BioNTech ja Moderna COVID-19 vastased vaktsiinid.

Ettepanek nr 1:

- Arvestades omikroni variandi levikut Eestis, teiste riikide ja uuringute esialgseid andmeid, on Eestis jätkuvalt COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks ja haiglakoormuse tõusu pidurdamiseks oluline esmase vaktsineerimiskuuuri ning tõhustusdoosidega hõlmamise tõstmine. Seda eriti 60+ elanikkonnas.
- Jansseni COVID-19 vastase vaktsiiniga esmase vaktsineerimiskuuuri läbinud 18+ elanikkonnal teha esimesel võimalusel tõhustusdoos, kui Jansseni COVID-19 vaktsiini manustamisest on möödunud vähemalt kaks kuud.
- AstraZeneca, Pfizer/BioNTechi ja Moderna COVID-19 vastase vaktsiiniga esmase vaktsineerimiskuuuri läbinud 18+ elanikkonnale võimaldada tõhustusdoosi alates kolme kuu möödumisel esmasest vaktsineerimiskuurist.
- Tõhustusdoosina kasutada Pfizer/BioNTechi ja Moderna COVID-19 vastast vaktsiini, erandjuhtudel (näiteks allergiline reaktsioon mRNA vaktsiinile) võib vaktsineerija kasutada selleks Jansseni vaktsiini.

Läbipõdenutele tõhustusdoosi soovitus osas arutelud jätkuvad ekspertkomisjoni.